

Für Zahnärzte:

Mundschleimhautkrebs bei Fanconi-Anämie-Patienten

Fachärzte für Zahnpflege spielen in der medizinischen Versorgung von Patienten, die unter Fanconi-Anämie (einer seltenen genetischen Störung) leiden, eine wichtige Rolle. Obwohl die Fanconi-Anämie in erster Linie als eine Bluterkrankung angesehen wird, kann Sie Auswirkungen auf alle Systeme des Körpers haben und führt in praktisch allen Fällen zu Krebs.

Schleimhautkrebs stellt ein besonderes Problem für Fanconi-Anämie-Patienten dar. Als der medizinische Dienstleister, der mit der Mundhöhle Ihres Patienten am vertrautesten ist, sind Sie in der einzigartigen Position, subtile Veränderungen oder Läsionen früh zu erkennen. Die Durchführung eines Mundkrebs-Screenings bei jedem Besuch stellt einen wichtigen Teil der gesamten Krebsüberwachung des Patienten dar. Wie bei allen anderen Patienten mit Krebs bieten die frühe Erkennung und Behandlung die beste Überlebenschance.

Wir möchten Sie gern zur Lektüre dieser Broschüre einladen und Sie darum bitten, sich direkt an uns zu wenden, wenn Sie noch Fragen haben. (Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.) Weitere Informationen über Fanconi-Anämie finden Sie auf unserer Webseite unter www.fanconi.org (oder in deutscher Sprache z.B. unter www.fanconi.de).

Überblick

Patienten mit Fanconi-Anämie (FA)

- weisen eine um das 500- bis 700-fache erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Plattenepithelkarzinomen (HNSCC) in Mund, Rachen, Speiseröhre, Genital- und Analbereich auf.
- entwickeln Krebs in einem jüngeren Alter als die Allgemeinbevölkerung, im durchschnittlichen Alter von 27 Jahren (die jüngsten sind 10 Jahre alt).
- zeigen gewöhnlich multifokale Veränderungen, darunter nicht-krebsartige Läsionen nebst prämaligen und invasiven Läsionen.
- haben aggressivere HNSCC (die 2-Jahres-Überlebensrate nach Diagnose liegt bei 50%)
- sprechen a) kam auf Bestrahlung an und dürfen b) auf keinen Fall (!) die übliche Chemotherapie erhalten, was die Früherkennung besonders wichtig macht

Die regelmäßige Kontrolle auf Mundschleimhautkrebs bei FA-Patienten sollte

- im Alter von 10-12 Jahren beginnen.
- auf halbjährlicher Basis von einem erfahrenen Spezialisten durchgeführt werden.
- sich nach der Untersuchungsmethode für Mundkrebs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) richten (Zusammenfassung auf der Rückseite).
- Zusätzlich sollte eine Überweisung zum Hals-Nasen-Ohren-Facharzt für eine faseroptische Untersuchung der Nasopharynx, Oropharynx, Hypopharynx und Larynx erfolgen, vor allem, wenn bleibende Symptome wie Odynophagie, Dysphagie und/oder Veränderungen der Stimme auftreten.

Weltgesundheitsorganisation

Standardisierte Methode zur Untersuchung von Mundkrebs*

➤ Extraorale Untersuchung

- Gesicht: Untersuchen Sie Gesicht, Kopf, Ohren und Hals. Achten Sie auf Ungleichmäßigkeiten oder Veränderungen der Haut.
 - Tasten Sie zur Erkennung vergrößerter Lymphknoten beidseitig die jeweiligen Lymphknotenbereiche ab.

➤ Untersuchung des perioralen und intraoralen Weichgewebes

- Lippen: Untersuchen Sie die Lippen sowohl bei geöffnetem als auch bei geschlossenem Mund. Achten Sie auf Farbe, Beschaffenheit und etwaige Auffälligkeiten.
- Lippenschleimhäute: Untersuchen Sie Lippenschleimhäute und den Sulcus des Mundvorhofs sowie Frenum und Mandibularfurche. Achten Sie auf Farbe, Beschaffenheit, mögliche Schwellungen oder andere Auffälligkeiten der vestibulären Schleimhäute und des Zahnfleischs.
- Mundschleimhäute: Untersuchen Sie die Mundschleimhäute rechts und links von der labialen Kommissur bis zur vorderen Mandelsäule. Achten Sie auf Veränderungen von Pigmentierung, Farbe, Beschaffenheit, Beweglichkeit und andere Auffälligkeiten.
- Zahnfleisch:
 - Untersuchen Sie die bukkale und labiale Erscheinung von Zahnfleisch- und Alveolarkämmen vom rechten hinteren Kiefer- und Alveolarkamm an entlang des Bogens bis zum linken hinteren Bereich und wieder zurück.
 - Untersuchen Sie die palatale und linguale Erscheinung von rechts nach links auf dem Gaumen und von rechts nach links auf der Zunge.
- Zunge:
 - Untersuchen Sie bei ruhender Zunge und teilweise geöffnetem Mund den Zungenrücken auf Schwellungen, Ulzeration, Belegtheit bzw. Größen-, Farb- oder Beschaffenheitsunterschiede. Achten Sie auf jede Änderung im Muster der die Zungenoberfläche bedeckenden Papillen und untersuchen Sie die Zungenspitze.
 - Achten Sie bei herausgestreckter Zunge auf mögliche Auffälligkeiten hinsichtlich Beweglichkeit und Stellung.
 - Untersuchen Sie unter Verwendung von Mundspiegeln die Zungenränder rechts- und linksseitig.
 - Erfassen Sie die Zungenspitze und untersuchen Sie die hinteren Bereiche der Zungenränder beidseitig.
 - Untersuchen Sie die ventrale Oberfläche.
 - Tasten Sie die Zunge auf Geschülste ab.
- Mundboden: Untersuchen Sie den Mundboden bei angehobener Zunge auf Veränderungen in Farbe, Beschaffenheit, Schwellungen oder andere Auffälligkeiten der Oberfläche.
- Gaumen:
 - Untersuchen Sie Vordergaumen und Gaumensegel bei weit geöffnetem Mund, zurückgelegtem Kopf und niedergedrückter Zunge.
 - Untersuchen Sie alle Gaumensegel- und Oropharyngeal-Gewebe.
 - Tasten Sie den Mundboden beidhändig auf Auffälligkeiten ab.
 - Tasten Sie alle Schleimhaut- bzw. Gesichtsgewebe ab, die auffällig erscheinen.

Fanconi Anemia Research Fund
1801 Willamette Street, Suite 200
Eugene, OR 97401
Telefon: 001-541-687-4658; Email: info@fanconi.org
www.fanconi.org

*Vollständige Informationen finden Sie unter:
<http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/topics/oralcancer/detectingoralcancer.htm>